

POČETAK CIJEPLJENJA PROTIV GRIPE 6. STUDENOG, 2019. GODINE

Početak cijepljenja protiv gripe cjepivom koje se nabavlja centraliziranim postupkom za sezonu 2019./ 2020. u Hrvatskoj započinje **6. studenog, 2019.** u ambulantama izabраних liječnika obiteljske medicine, pedijatarā i Službama za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo.

Prethodne sezone (2018./ 2019.) u Hrvatskoj je distribuirano 330.720 doza cjepiva od čega je 98% potrošeno. U Osječko - baranjskoj županiji distribuirano je 21.520 doza cjepiva, koja su u potpunosti bila potrošena.

Ove godine naručeno je 360.000 doza cjepiva, što je oko 10% više nego lani. Količina cjepiva je procijenjena na temelju odaziva na cijepljenje u prethodnoj sezoni (2018./2019.). **Za ovogodišnju sezonu predviđeno je 21.600 doza za Osječko-baranjsku županiju.**

Ovosezonsko **četverovalentno** cjepivo - **Vaxigrip Tetra**, koje je osigurano za cijepljenje rizičnih skupina u skladu je s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije i EU-a za sezonu 2019./2020. Ovosezonsko cjepivo sadrži sojeve dva podtipa virusa gripe A i dva tipa virusa gripe B:

- A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09 - sličan soj
- A/Kansas/14/2017 (H3N2) – sličan soj
- B/Colorado/06/2017 – sličan soj
- B/Phuket/3073/2013 – sličan soj

Cjepivo je prvenstveno namijenjeno, a time i besplatno za slijedeće kategorije stanovništva:

- osobe životne dobi 65 godina i starije,
- štićenici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika (bez obzira na dob, uključujući i djecu),
- pacijenti s kroničnim oboljenjima, posebice oboljenjima srca i pluća, uključujući i djecu, a posebno djecu s oštećenom plućnom funkcijom (cistična fibroza, kronična astma, bronhopulmonalna displazija) i s kongenitalnim manama,
- odrasli i djeca s kroničnim bolestima metabolizma (uključujući dijabetes melitus), kroničnim bolestima bubrega, hemoglobinopatijama, neurološkim i neuromuskularnim bolestima koje utječu na disanje i oštećenjem imunološkog sustava (uključujući oboljele od malignih bolesti, osobe na dugotrajnoj terapiji kortikosteroidima, osobe s HIV infekcijom i sl.),
- djeca i adolescenti (u dobi od 6 mj. do 18. god.) na dugotrajnoj terapiji lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu (radi izbjegavanja nastanka Reye sindroma uz influenzu),
- u slučaju da se osobe za koje je cijepljenje preporučljivo, ne mogu cijepiti zbog postojanja kontraindikacija, umjesto njih se pod istim uvjetima preporučuje cijepiti osobe iz njihove bliske okoline, na primjer kućni kontakti (uključujući djecu), osobe koje pružaju kućnu medicinsku njegu i sl.,
- radnici domova za starije osobe te institucija za njegu kroničnih bolesnika,
- zdravstveni radnici,
- trudnice.

Svi ostali koji žele smanjiti rizik od gripe, mogu se cijepiti bilo kada „komercijalno“ nabavljenim cjepivom u dogovoru s izabranim liječnikom. Cijepljenje izvan predviđenih kategorija cjepivom koje se nabavlja centraliziranim postupkom biti će moguće **ako** ostane cjepiva nakon što se cijepi osobe za koje je prvenstveno namijenjeno i besplatno i cijena će biti 33 kune.

Svaki liječnik primarne zdravstvene zaštite može naručiti, putem ljekarne ili veledrogerije, cjepivo za osobe koje ima u skrbi i cijepiti ih uz plaćanje.