

DATUM	LOKACIJA	BROJNOST			ALERGIJSKA REAKCIJA
		NISKA	UMJERENA	VISOKA	

Brojnost: niska – broj uboda ne prelazi 15 u 15 minuta
umjerena – od 15 do 50 uboda u 15 minuta
visoka – preko 50 uboda u 15 minuta

Alergijska reakcija na ubod komarca

Alergijske reakcije na ubode komaraca često prolaze nezamijećene jer obično nemaju težih simptoma. Uzrok alergiji su proteini iz sline komarca, tj. ženke komarca, koju u malim količinama injicira ispod kože tijekom uboda. Djeca obično imaju izraženije reakcije na ubode komaraca od odraslih.

Simptomi koji mogu upućivati na alergijsku reakciju:

- velika otekline na mjestu uboda
- veliko područje svrbeža kože
- modrice blizu mjesta uboda
- osip na mjestu ili oko mjesta uboda
- promjene traju danima ili tjednima
- u **vrlo rijetkim** slučajevima može doći do anafilaktičke reakcije (životno ugrožavajuće stanje koje se očituje otokom mekog tkiva grla i otežanim disanjem, te zahtijeva hitnu medicinsku pomoć)

U slučaju alergijske reakcije, za ublažavanje simptoma koristite topikalne kreme i losione protiv svrbeža kože. Za veće reakcije i izraženije simptome možete uzimati antihistaminike.

Pokušajte izbjeći ubode komaraca noseći odjeću dugih rukava, svijetlih boja, te koristite repelente prilikom boravka na otvorenom (osobito u ranim jutarnjim satima i predveče kad je aktivnost komaraca najveća). Na prozore i vrata postavite zaštitne mrežice.

Tihana Šlezak, dr.med.